

大気浮遊じんの放射能濃度測定結果 (H28. 8/31~9/14)

ちりやほこりに付着した放射性物質の飛散状況を調べるため、市内で収集した大気1m³あたりの浮遊放射性物質の濃度(ミリベクレル/m³)を測定しました。※下段()内は検出限界値。

測定地点			8/31~9/7	9/7~9/14
小高区	川房公会堂 (川房)	Cs134	0.043 (0.016)	0.029 (0.013)
		Cs137	0.330 (0.016)	0.170 (0.011)
	金房小学校 (飯崎)	Cs134	0.026 (0.018)	0.015 (0.011)
		Cs137	0.130 (0.018)	0.076 (0.013)
	塚原公会堂 (塚原)	Cs134	0.036 (0.015)	不検出 (0.012)
		Cs137	0.210 (0.014)	0.040 (0.013)
鹿島区	鹿島区役所 (西町)	Cs134	0.016 (0.012)	不検出 (0.014)
		Cs137	0.082 (0.011)	0.038 (0.012)
	鹿島区3-3消防屯所 (南海老)	Cs134	不検出 (0.014)	不検出 (0.016)
		Cs137	0.049 (0.014)	不検出 (0.016)

【お知らせ】平成28年4月から、試料の採取方法が7日間の連続吸引に変わりました。

(ミリベクレル/m³)

測定地点			8/31~9/7	9/7~9/14
原町区	横川ダム (馬場)	Cs134	0.073 (0.015)	0.041 (0.014)
		Cs137	0.350 (0.015)	0.220 (0.011)
	原町保健センター (小川町)	Cs134	0.015 (0.012)	不検出 (0.015)
		Cs137	0.087 (0.012)	0.052 (0.015)
	高平生涯学習センター (下高平)	Cs134	不検出 (0.016)	不検出 (0.011)
		Cs137	0.083 (0.013)	0.044 (0.014)
市立総合病院 (高見町)	Cs134	0.036 (0.014)	不検出 (0.012)	
	Cs137	0.160 (0.012)	0.062 (0.010)	
大原公会堂 (大原)	Cs134	0.028 (0.015)	0.017 (0.014)	
	Cs137	0.130 (0.018)	0.084 (0.012)	

※検出限界値はおおむね0.02~0.03mBq/m³の範囲にありますが、測定サンプル毎に変動します。そのため、放射能濃度が検出限界値未満の場合、「不検出」と判定されます。

★渡邊正己京都大学名誉教授 (市放射線健康対策委員会委員長)による解説★

今回の観測値は、セシウム134が平均で0.019 mBq/m³、セシウム137が平均で0.120mBq/m³と、いずれも事故前の3年間に全国の浮遊じんに含まれていた放射能の測定範囲内に収まる計測値となりました。

最近の測定では、この状態が定常化しており、飛散するちりやほこりに含まれる放射能による健康影響に注意を払う必要性は極めて少なくなっているといえます。